Inferência Estatística para Duas Amostras

Roteiro

1. Introdução
2. Inferência para a Diferença de Médias
 - i. População normal com variâncias conhecidas
 - ii. População normal com variâncias desconhecidas
3. Teste t Emparelhado
4. Inferência para as Variâncias de Duas Populações
5. Inferência para as Proporções de Duas Populações
6. Roteiro dos Procedimentos de Inferência
7. Referências

Introdução

Situação Geral

- População 1:

- √ Média μ_1 e variância σ_1^2 .

- √ Amostra de tamanho n_1 .

- $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}$.

- População 2:

- √ Média μ_2 e variância σ_2^2 .

- √ Amostra de tamanho n_2 .

- $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}$.

- Objetivo das aplicações:

- √ Estudar a diferenças nos parâmetros das 2 populações

- Aplicação – Experimento planejado:
 - √ Comparar condições diferentes (deliberadas e propositais), verificando se elas produzem efeitos estatísticos na resposta
 - √ Condições são chamadas **tratamentos**.
- Experimento comparativo:
 - √ Controlam-se os tratamentos e observa-se a variação na variável resposta.
- Relação de causa-e-efeito
 - √ Verifica-se significância estatística em resposta de experimento aleatório
 - √ Conclusão:
 - Diferença nos tratamentos resultou na diferença na resposta

- Aplicação – Estudo observacional:
 - √ Avaliam se há associação entre um determinado fator e uma resposta, sem, entretanto, intervir diretamente na relação analisada.
 - √ Indivíduos da amostra não foram designados aos grupos por processo aleatório, mas já estavam classificados nos respectivos grupos, no início da pesquisa.
- Relação de causa-e-efeito
 - √ Difícil identificar causalidade
 - Diferença estatisticamente observada na resposta pode ser devida a algum outro fator (ou grupo de fatores) não devido aos tratamentos que não foi equalizado pela aleatorização.

Exemplo

- Experimento completamente aleatorizado:
 - √ Duas formulações de tintas
 - √ Resposta: tempo de secagem
 - √ Objetivo do estudo:
 - Nova formulação resulta em efeito significativo?
 - √ Amostras
 - 10 espécimes de teste a cada uma das formulações
 - √ Procedimento:
 - Aplicação aleatória das formulações nos 20 espécimes

Exemplo

- Níveis de ferro no corpo e risco cardíaco
 - √ Amostra de 1931 homens
 - √ Rastreamento ao longo de 5 anos
 - √ Verificação de efeito significativo de níveis crescentes de ferro na incidência de ataques cardíacos
 - √ Comparada incidência de ataques cardíacos nos grupos (tratamentos): “nível baixo de ferro” e “nível alto de ferro”
 - √ Os indivíduos não foram alocados aleatoriamente em cada grupo
- Diferença no risco cardíaco pode ser atribuída a outro fator fundamental (colesterol, por exemplo)

Inferência na Diferença de Médias – População Normal com Variâncias Conhecidas

Suposições

- Amostras:
 - √ População 1: $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}$.
 - √ População 2: $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}$.
- Populações (X_1 e X_2) independentes
- Populações normais
- Variâncias conhecidas (σ_1^2 e σ_2^2)
- Objetivo
 - √ Inferência estatística para diferença de médias $\mu_1 - \mu_2$.

Estimação de $\mu_1 - \mu_2$

- Estimador natural: $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$
- Esperança: $E[\bar{X}_1 - \bar{X}_2] = \mu_1 - \mu_2$
- Variância: $\text{Var}[\bar{X}_1 - \bar{X}_2] = \text{Var}[\bar{X}_1] + \text{Var}[\bar{X}_2] = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$
- A grandeza: $Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$

tem distribuição normal padrão

Teste de Hipóteses para $\mu_1 - \mu_2$

- Hipótese nula:
 - √ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$.
 - Δ_0 : valor pré-especificado
- Estatística de teste: $Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$
- Hipóteses alternativas:

Hipótese alternativa	Critério de rejeição
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$z_0 > z_{\alpha/2}$ ou $z_0 < -z_{\alpha/2}$.
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z_0 > z_\alpha$.
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z_0 < -z_\alpha$.

Exemplo 10-1

- Tempo de secagem de uma tinta:
 - √ Deseja-se reduzir tempo de secagem de um zarcão
 - √ Formulações testadas:
 1. Química-padrão
 2. Acrescentado novo ingrediente para secagem
 - √ $\sigma = 8$ min. (dados históricos)
 - Variabilidade não deve ser afetada por novo ingrediente
 - √ Amostras:
 - Formulação 1: 10 espécimes
 - Formulação 2: 10 espécimes
 - √ Os 20 espécimes são pintados em ordem aleatória

- Dados amostrais:

√ Tempos médios de secagem:

Química-padrão		Formulação nova	
n_1	$\bar{x}_1$	n_2	$\bar{x}_2$
10	121 min.	10	112 min.

- Quais conclusões sobre a eficiência do novo ingrediente?
 - √ Nível de significância do teste (α): 5%

- Procedimento de teste:
 1. Grandeza de interesse: diferença nos tempos médios de secagem ($\mu_1 - \mu_2$) e $\Delta_0 = 0$.
 2. $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ ou $H_0: \mu_1 = \mu_2$.
 3. $H_1: \mu_1 > \mu_2$. Rejeição H_0 se fórmula 2 reduzir tempo
 4. $\alpha = 0,05$
 5. Estatística de teste: $Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$
 6. Rejeite H_0 se $z_0 > z_{0,05} = 1,645$
 7. Estatística de teste observada: $z_0 = \frac{121 - 112}{\sqrt{\frac{(8)^2}{10} + \frac{(8)^2}{10}}} = 2,52$
 8. Conclusão:
 - $z_0 = 2,52 > 1,645 \rightarrow$ Rejeitamos H_0
 - Concluimos, com $\alpha = 5\%$, que a adição do novo ingrediente à tinta reduz significativamente o tempo de secagem.

- Cálculo do p-valor – Minitab:

√ No exemplo: $H_1: \mu_1 > \mu_2$.

√ Estatística de teste observada:

• $z_0 = 2,52$

```

MTB > CDF 2,52;
SUBC> Normal.

Cumulative Distribution Function

Normal with mean = 0 and standard deviation = 1

    x    P( X <= x )
  2,52    0,994132
    
```

√ $p = P\{Z > 2,52\} = 1 - \Phi(2,52) = 1 - 0,9941 = 0,0059$

- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ seria rejeitada com qualquer nível de significância $\alpha \geq 0,0059$

- Minitab:
 - √ Não possui comando para execução de teste Z de diferença de médias
 - √ Possível utilizar teste Z para uma amostra!

Stat > Basic Statistics > 1-Sample Z

$\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \sqrt{(8)^2 + (8)^2} = 11,3137$

- Saída:

One-San		Limite inferior com 95% de confiança		Estatística	
Test of $\mu = 0$					
The assumed standard deviation = 11,3137					
		95%			
N	Mean	Lower Bound	Z	P	
10	9,00	3,12	2,52	0,006	

- √ Limite inferior com 95% de confiança excede 0
 - Rejeita-se $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$, concluindo-se que $H_1: \mu_1 > \mu_2$ é verdadeira
 - Valor-p confirma conclusão

Teste para Amostras Grandes

- Na maioria das situações práticas:
 - √ σ_1^2 σ_2^2 são desconhecidas.
 - √ Não podemos estar certo que a população seja bem modelada por uma distribuição normal
- Se as amostras forem grandes (n_1 e $n_2 > 40$):
 - √ Pode-se substituir σ_1 e σ_2 pelos desvios-padrão amostrais s_1 e s_2 .
 - √ Usa-se a estatística Z_0 para teste de hipótese sobre média da população
 - Baseado no TCL

Curvas Características de Operação

- Curvas de β vs. um parâmetro d , para vários tamanhos amostrais
 - √ Gráficos VIIa, VIIb, VIIc e VIId – Apêndice
 - √ Curvas para $\alpha = 0,05$ e $\alpha = 0,01$
- Parâmetro d :
$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2 - \Delta_0|}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} = \frac{|\Delta - \Delta_0|}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$$
 - √ d : Fator de não centralidade
 - √ Tem-se de escolher tamanhos iguais de amostra
 - √ Conjunto de curvas características pode ser usado para todos os problemas, independente dos valores de μ_0 e σ .

- Teste bilateral e nível de significância $\alpha = 0,05$

Chart VI Operating Characteristic Curves

(a) O.C. curves for different values of n for the two-sided normal test for a level of significance $\alpha = 0.05$.

- Teste bilateral e nível de significância $\alpha = 0,01$

(b) O.C. curves for different values of n for the two-sided normal test for a level of significance $\alpha = 0.01$.

- Teste unilateral e nível de significância $\alpha = 0,05$

(c) O.C. curves for different values of n for the one-sided normal test for a level of significance $\alpha = 0.05$.

- Teste unilateral e nível de significância $\alpha = 0,01$

(d) O.C. curves for different values of n for the one-sided normal test for a level of significance $\alpha = 0.01$.

Tamanhos Amostrais Desiguais

- Situações usuais:
 - √ Os custos de coleta de dados podem ser substancialmente diferentes entre as duas populações
 - √ A variância de uma população pode ser bem maior que a outra.
 - √ Nesses casos, são utilizadas amostras de tamanhos diferentes

Curvas Características Operacionais

- Valor equivalente de n (se $n_1 \neq n_2$):

$$n = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

- √ Caso n_1 e n_2 tenham sido fixados previamente
- √ As curvas CO são usadas com um d especificado de modo a obter β .

- Se d é conhecido e for necessário determinar n_1 e n_2 para obter um β^* especificado:
 - √ Escolhem-se valores para n_1 e n_2 .
 - √ Calcula-se o valor equivalente de n .
 - √ Determina-se β na curva CO correspondente
 - √ Se $\beta = \beta^*$.
 - Os valores escolhidos de n_1 e n_2 são satisfatórios
 - √ Se $\beta \neq \beta^*$.
 - Ajustam-se os valores de n_1 e n_2 , repetindo-se o processo.

Exemplo 10-2

- Tempo de secagem de uma tinta
 - √ Tamanho de amostra a partir das curvas CO
 - √ Diferença verdadeira nos tempos de secagem tão grande quanto 10 minutos
($\Delta = 10$)
 - √ Poder do teste de no mínimo 0,9, com $\alpha = 5\%$
 - √ Valor do parâmetro da abscissa:

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2 - \Delta_0|}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} = \frac{|\Delta - \Delta_0|}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} = \frac{10}{\sqrt{8^2 + 8^2}} = 0,88$$

Tamanho de Amostra – Fórmulas

- Suposições:
 - √ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ é falsa
 - √ Diferença verdadeira é $\mu_1 - \mu_2 = \Delta$. $\Delta > \Delta_0$.
- Interesse:
 - √ Obter tamanho de amostra que leve a um valor específico de probabilidade de erro tipo II, β , para uma dada diferença de médias Δ , com um nível de significância α .

- Expressão para o erro β para a alternativa bilateral

$$\beta = \Phi \left(z_{\alpha/2} - \frac{\Delta - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right) - \Phi \left(-z_{\alpha/2} - \frac{\Delta - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right)$$

- √ Cálculo de tamanho de amostra é similar ao caso de uma única amostra

- Tamanho de amostra para um teste bilateral para a diferença de médias, com $n_1 = n_2$ e variâncias conhecidas

- √ Diferença verdadeira nas médias: Δ .
- √ Poder de no mínimo $1 - \beta$.

$$n \approx \frac{(z_\beta + z_{\alpha/2})^2 (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{(\Delta - \Delta_0)^2}$$

- √ A expressão de β pode ser obtida para o caso em que $n = n_1 = n_2$.

Exemplo 10-3

- Tempo de secagem de uma tinta
 - √ Diferença verdadeira nos tempos de secagem tão grande quanto 10 minutos
($\Delta = 10$)
 - √ Poder do teste de no mínimo 0,9, com $\alpha = 5\%$
 - √ Determinação tamanho amostra:
- $$n \approx \frac{(z_\beta + z_\alpha)^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{(\Delta - \Delta_0)^2} = \frac{(1,645 + 1,28)^2[(8)^2 + (8)^2]}{(10 - 0)^2} = 11$$
- $z_\alpha = z_{0,05} = 1,645$ e $z_\beta = z_{0,10} = 1,28$

- Cálculo tamanho da amostra - Minitab

Stat > Power and Sample Size > 1-Sample Z

$$\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \sqrt{(8)^2 + (8)^2} = 11,3137$$

- Saída – Minitab

- √ Dados:
 - Diferença: 10
 - Poder: 0,90
 - Nível de significância (α): 5%

```

Power and Sample Size
1-Sample Z Test
Testing mean = null (versus > null)
Calculating power for mean = null + difference
Alpha = 0,05 Assumed standard deviation = 11,3137

Difference 10
Sample Size 11
Target Power 0,9
Actual Power 0,900893
    
```

- Determinação intervalo de confiança para $\mu_1 - \mu_2$
 - √ Para amostras provenientes de populações normais com variâncias conhecidas:

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

√ então:

$$P \left\{ -z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \leq z_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$

$$P \left\{ \bar{X}_1 - \bar{X}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \right\}$$

$$- \mu_2 \leq \bar{X}_1 - \bar{X}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1$$

Intervalo de Confiança para a Diferença de Médias, Variâncias Conhecidas

- Seja $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ a diferença das médias de duas amostras aleatórias, de tamanhos n_1 e n_2 , oriundas de populações normais com variâncias σ_1^2 e σ_2^2 conhecidas.

√ Intervalo com $100(1-\alpha)\%$ de confiança para $\mu_1 - \mu_2$:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

sendo $z_{\alpha/2}$ o percentil superior com $\alpha/2(100)\%$ da normal padrão

√ Intervalo de 90% de confiança para a diferença da resistência média $\mu_1 - \mu_2$:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$87,6 - 74,5 \pm 1,645 \sqrt{\frac{(1)^2}{10} + \frac{(1,5)^2}{12}} = 13,1 \pm 0,882$$

√ Intervalo com 90% de confiança para a resistência média à tensão (kgf/mm²)

$$[12,128 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 13,982]$$

Exemplo 10-4

- Resistência à tensão no alumínio:
 - √ Testes de resistência à tensão em dois tipos diferentes de estruturas de alumínio usadas na fabricação de asas de avião
 - √ Desvios-padrão considerados conhecidos:
 - Experiências passadas com processo de fabricação e testes
 - $\sigma_1 = 1$ e $\sigma_2 = 1,5$
 - √ Dados amostrais obtidos:

Estrutura 1		Estrutura 2	
n_1	$\bar{x}_1$	n_2	$\bar{x}_2$
10	87,6	12	74,5

- Conclusões:
 - √ O IC não inclui o zero
 - É significativa a diferença entre a resistência média das estrutura 1 e 2.
 - √ Estamos 90% confiantes que a resistência média da estrutura 1 excede a resistência média da estrutura 2 por um valor entre 12,22 e 13,98 kgf/mm².

Escolha do Tamanho da Amostra

- Se os desvios-padrão σ_1 e σ_2 forem conhecidos e os dois tamanhos das amostras n_1 e n_2 forem iguais ($n_1 = n_2 = n$)

√ Determinação do tamanho das amostras de modo que o erro em estimar $\mu_1 - \mu_2$ seja menor que E com uma confiança $100(1 - \alpha)\%$

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

- Deve ser arredondado para mais se n não for um inteiro

Limites Unilaterais de Confiança

- Limites unilaterais com $(1 - \alpha)100\%$ de confiança para $\mu_1 - \mu_2$, com variâncias conhecidas

√ Estabelecer $l = -\infty$ ou $u = \infty$

√ Trocar $z_{\alpha/2}$ por z_α .

- Limite superior de confiança:

$$\mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

- Limite inferior de confiança:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2$$

Inferência na Diferença de Médias – Populações Normais com Variâncias Desconhecidas

Inferência na Diferença de Médias de Populações com Variâncias Desconhecidas

- Variâncias σ_1^2 e σ_2^2 desconhecidas
 - √ Se n_1 e $n_2 > 40$ utilizam-se procedimentos anteriores
 - √ Se são retiradas **pequenas amostras** de populações **normais**:
 - Caso 1: Variâncias iguais ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)
Homocedasticidade
 - Caso 2: Variâncias diferentes ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)
Heterocedasticidade
 - Testes e intervalos de confiança baseados na distribuição t.

Caso 1 – Variâncias Iguais

- Suponha 2 populações **normais** independentes com médias desconhecidas μ_1 e μ_2 e variâncias **desconhecidas**, porém iguais $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.
- Hipóteses:
 - $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$
 - $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$
- Nível de significância do teste: α .

Estimação de $\mu_1 - \mu_2$

- Estimador natural: $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$
- Esperança: $E[\bar{X}_1 - \bar{X}_2] = \mu_1 - \mu_2$
- Variância:

$$\text{Var}[\bar{X}_1 - \bar{X}_2] = \text{Var}[\bar{X}_1] + \text{Var}[\bar{X}_2] = \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2} = \sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)$$
- Como estimar a variância desconhecida σ^2 ?
 - √ Há duas amostras de populações diferentes, porém com mesma variância

Estimador Combinado de σ^2

- Parece razoável combinar as duas variâncias amostrais S_1^2 e S_2^2 .

√ Como?

- Estimador combinado de σ^2 :

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

√ S_p^2 pode ser escrito como uma média ponderada:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)}{n_1 + n_2 - 2} S_1^2 + \frac{(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2} S_2^2 = wS_1^2 + (1 - w)S_2^2$$

- Os pesos dependem do tamanho das amostras
- Se $n_1 = n_2$, então $w = 0,5$ e S_p^2 será a média aritmética entre S_1^2 e S_2^2 .

- Sabemos que:

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

√ Substituindo σ por S_p , temos:

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Teste t Combinado para $\mu_1 - \mu_2$

- Hipótese nula:

$$\sqrt{H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0}$$

- Δ_0 : valor pré-especificado

- Estatística de teste:
$$T_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \Delta_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

- Hipóteses alternativas:

Hipótese alternativa	Critério de rejeição
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$ t_0 > t_{\alpha/2, (n_1 + n_2 - 2)}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$t_0 > t_{\alpha, (n_1 + n_2 - 2)}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$t_0 < -t_{\alpha, (n_1 + n_2 - 2)}$

Exemplo 10-5

- Rendimento de catalisador

√ Análise de influência de dois catalisadores no rendimento médio de processo químico

- Catalisador 1: em uso

- Catalisador 2: aceitável e mais barato

(deve ser usado se não mudar rendimento do processo)

√ Há alguma diferença entre os rendimentos médios?

- Nível de confiança (α): 5%

- Dados amostrais:

√ Rendimento de catalisadores

Catalisador 1			Catalisador 2		
n_1	$\bar{x}_1$	s_1	n_2	$\bar{x}_2$	s_2
8	92,255	2,39	8	92,733	2,98

√ Cálculo do desvio-padrão combinado

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{(7)(2,39)^2 + (7)(2,98)^2}{8 + 8 - 2}}$$

$$= \sqrt{7,30} = 2,70$$

- Procedimento de teste:

1. Grandeza de interesse: diferença nos rendimentos médios de processo ($\mu_1 - \mu_2$) e $\Delta_0 = 0$.

2. $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ ou $H_0: \mu_1 = \mu_2$.

3. $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$. Rejeição H_0 se catalisador 2 alterar rendimento

4. $\alpha = 0,05$

5. Estatística de teste:
$$T_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - 0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \underset{H_0}{\sim} t_{n_1 + n_2 - 2}$$

6. Rejeite H_0 se $|t_0| > t_{0,025; 14} = 2,145$

7. Estatística de teste observada:
$$t_0 = \frac{92,255 - 92,733}{2,70 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}}} = -0,35$$

8. Conclusão:

- $|t_0| = 0,35 < 2,145 \rightarrow$ Falhamos em rejeitar H_0

- Concluimos, com $\alpha = 5\%$, que não temos evidência forte pra concluir que o catalisador 2 altera rendimento do processo.

• Cálculo do p-valor – Minitab:

√ No exemplo: $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

√ Estatística de teste observada:

- $t_0 = 0,35$

```
MTB > CDF 0,35;
SUBC>
SUBC> t 14.

Cumulative Distribution Function

Student's t distribution with 14 DF

x P( X <= x )
0,35 0,634226
```

√ $p = 2 P\{t_{14} > 0,35\} = 2(1 - 0,6342) = 0,7316$

- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ não pode ser rejeita a um nível $\alpha = 5\%$

• Minitab:

√ Banco de dados: *BD_producao.xlsx/ catalisadores*

Stat > Basic Statistics > 2-Sample t

• Análise gráfica:

√ Box-plot comparando resultados dos catalisadores

- √ Não aparenta haver diferença entre os catalisadores.
- √ Catalisador 2 tem variabilidade ligeiramente maior

√ Gráfico de probabilidade normal das amostras

- Os gráficos de probabilidade normal (e p-valor) indicam que não há problema com a suposição de normalidade
- Indicação de homocedasticidade. (Ambas as linhas têm inclinações similares)
- Como verificar formalmente a homocedasticidade?

• Saída:

Two-Sample T-Test and CI: catalisador_1; catalisador_2

Two-sample T for catalisador_1 vs catalisador_2

	N	Mean	StDev	SE Mean
catalisador_1	8	92,26	2,39	0,84
catalisador_2	8	92,73	2,98	1,1

Difference = mu (catalisador_1) - mu (catalisador_2)
 Estimate for difference: -0,48
 95% CI for difference: (-3,37; 2,42)
 T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,35 P-Value = 0,729 DF = 14
 Both use Pooled StDev: 2,7009

Teste t combinado

S_p

IC 95%

- ✓ Valor-p confirma conclusão de não rejeitar H₀.
- ✓ zero pertence ao intervalo com 95% de confiança.
 - Não há evidência amostral para rejeitar H₀: μ₁ - μ₂ = 0.

Caso 2 – Variâncias Diferentes

- Suponha duas populações **normais** independentes com médias desconhecidas μ₁ e μ₂ e variâncias **desconhecidas**, porém diferentes σ₁² ≠ σ₂².
- Não existe um valor exato da estatística t
 - ✓ Pode-se aplicar um resultado aproximado
 - ✓ Estatística T*
 - Teste T similar àquele do caso de homocedasticidade
 - Graus de liberdade da t são trocados (v ao invés de n₁ + n₂ - 2)

Teste t – Variâncias Desconhecidas e Desiguais

- Supondo H₀: μ₁ - μ₂ = Δ₀ verdadeira:
 - ✓ Estatística de teste: $T_0^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$
 - ✓ Distribuição amostral: T₀^{*} ~ t_ν
 - Graus de liberdade: $\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}}$
 - Para ν não inteiro, arredonde para menor inteiro mais próximo (mais conservativo para rejeitar H₀)
(pacotes estatísticos calculam com valores não inteiros)

Exemplo 10-6

- Arsênio em água
 - ✓ Concentração de arsênio em suprimentos públicos de água é risco potencial à saúde
 - ✓ Amostras:
 - 10 comunidades metropolitanas
 - 10 comunidades rurais
 - ✓ Interesse:
 - Determinar se há alguma diferença nas concentrações (ppb) médias de arsênio entre os dois grupos de comunidades

• Dados amostrais:

√ Concentração de arsênio em água potável

Região Metropolitana			Catalisador 2		
n_1	$\bar{x}_1$	s_1	n_2	$\bar{x}_2$	s_2
10	12,5	7,63	10	27,5	15,3

√ Gráfico de probabilidade normal dos dados

- Suposição de normalidade aparenta estar atendida
- Improvável que variâncias da população sejam iguais
 - √ Inclinações muito diferentes

• Procedimento de teste:

1. Parâmetros de interesse: concentrações médias de arsênio, μ_1 e μ_2 . Interesse: determinar se $\mu_1 - \mu_2 = 0$.
2. $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ ou $H_0: \mu_1 = \mu_2$.
3. $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.
4. $\alpha = 0,05$ (digamos) $T_0^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - 0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \stackrel{H_0}{\sim} t_\nu$
5. Estatística de teste:
6. Rejeite H_0 se $|t_0^*| > t_{0,025; 13} = 2,160$ $\nu = 13, 2 \approx 13$
7. Estatística de teste observada: $t_0^* = \frac{12,5 - 27,5}{\sqrt{\frac{(7,63)^2}{10} + \frac{(15,3)^2}{10}}} = -2,77$
8. Conclusão:
 - $|t_0^*| = 2,77 > 2,160 \rightarrow$ Rejeitamos H_0
 - Há evidência para concluir, com $\alpha = 5\%$, que a concentração média de arsênio na água potável na zona rural do Arizona é diferente daquela da área metropolitana.

• Cálculo dos graus de liberdade desvio-padrão combinado

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}} = \frac{\left(\frac{(7,63)^2}{10} + \frac{(15,3)^2}{10}\right)^2}{\frac{\left(\frac{(7,63)^2}{10}\right)^2}{9} + \frac{\left(\frac{(15,3)^2}{10}\right)^2}{9}} = 13,2 \approx 13$$

• Valor crítico para teste bilateral com $\alpha = 5\%$

- √ Graus de liberdade aproximados: $t_{0,025; 13} = 2,160$
- √ Graus de liberdade conforme cálculo: $t_{0,025; 13,2} = 2,157$

• Cálculo do p-valor – Minitab:

√ No exemplo: $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

√ Estatística de teste observada:

• $|t_0| = 2,77$

```
MTB > CDF 2,77;
SUBC> t 13,2.

Cumulative Distribution Function

Student's t distribution with 13,2 DF

x P( X <= x )
2,77 0,992135
```

√ $p = 2 P\{t_{13,2} > 2,77\} = 2(1 - 0,9921) = 0,0158$

- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ é rejeitada a um nível $\alpha = 5\%$
- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ não é rejeitada a um nível $\alpha = 1\%$

• Saída:

Two-Sample T-Test and CI: concentracao_met; concentracao_rur

Two-sample T for concentracao_met vs concentracao_rur

	N	Mean	StDev	SE Mean
concentracao_met	10	12,50	7,63	2,4
concentracao_rur	10	27,5	15,3	4,9

Difference = mu (concentracao_met) - mu (concentracao_rur)

Estimate for difference: -15,00

95% CI for difference: (-28,71; -3,29)

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -2,77 P-Value = 0,016 DF = 13

Estadísticas descritivas

Teste t combinado

IC 95%

p-valor aproximado similar ao calculado

- ✓ Valor-p confirma conclusão de rejeitar H_0 a um nível $\alpha = 5\%$.
- ✓ zero não pertence ao intervalo com 95% de confiança.
 - Limite superior bem abaixo de zero
 - Há evidência amostral para rejeitar H_0 : $\mu_1 - \mu_2 = 0$.

Erro Tipo II e Tamanho da Amostra

- Curvas Características de Operação:
 - ✓ Gráficos VIIe, VIIf, VIIg e VIIIh – Apêndice
 - ✓ Curvas para $\alpha = 0,05$ e $\alpha = 0,01$
 - ✓ Usadas quando $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma$.
 - Quando $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ a distribuição de T_0^* será desconhecida para H_0 falsa.
 - ✓ Parâmetro d:
$$d = \frac{|\Delta - \Delta_0|}{2\sigma}$$
 - Δ : diferença verdadeira entre as médias populacionais.
 - ✓ Tamanho da amostra (n^*): $n^* = 2n - 1$
 - Para utilizar curvas CO, considerar $n = n^*$.

- Como no teste t para uma única amostra, podemos:
 - ✓ Utilizar de estimativa prévia de σ^2 através de experimento piloto
 - ✓ Usar da variância amostral s^2 para estimar σ^2 .
 - Para avaliar desempenho do teste após coleta dos dados
 - ✓ Definir a diferença que se quer detectar relativa a σ .
 - Caso não haja experiência prévia que possa ser usada

- Teste bilateral e nível de significância $\alpha = 0,05$

(e) O.C. curves for different values of n for the two-sided t -test for a level of significance $\alpha = 0.05$.

- Teste bilateral e nível de significância $\alpha = 0,01$

(f) O.C. curves for different values of n for the two-sided t -test for a level of significance $\alpha = 0.01$.

- Teste unilateral e nível de significância $\alpha = 0,05$

(g) O.C. curves for different values of n for the one-sided t -test for a level of significance $\alpha = 0.05$.

- Teste unilateral e nível de significância $\alpha = 0,01$

(b) O.C. curves for different values of n for the two-sided normal test for a level of significance $\alpha = 0.01$.

Exemplo 10-7

- Rendimento de catalisador
 - √ Influência de dois catalisadores no rendimento médio de processo químico
 - Catalisador 1: em uso
 - Catalisador 2: aceitável e mais barato (deve ser usado se não mudar rendimento do processo)
 - √ Nível de confiança do teste (α): 5%
 - √ Qual tamanho de amostra para rejeição de H_0 se catalisador 2 produzir rendimento médio que difira 4% do rendimento médio do catalisador 1, com probabilidade de no mínimo 85%

- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs. $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.
- Estimativa grosseira de σ (comum): $s_p = 2,70$
- Distância padronizada:

$$d = \frac{|\Delta|}{2\sigma} = \frac{4}{(2)(2,70)} = 0,74$$

- Probabilidade de erro tipo II: $\beta = 1 - 0,85 = 0,15$

(e) O.C. curves for different values of n for the two-sided t -test for a level of significance $\alpha = 0.05$.

√ Determinação do tamanho das amostras:

- $n^* = 20$ (leitura gráfica)

- Tamanho das amostras: $n_1 = n_2 = n$

$$n = \frac{n^* + 1}{2} = \frac{20 + 1}{2} = 10,5 \approx 11$$

- Cálculo Poder - Minitab

Stat > Power and Sample Size > 2-Sample t

- Saída - Minitab

√ Suposição de homocedasticidade.

√ Dados:

- Diferença: 4
- Poder: 0,85

Difference	Sample Size	Target Power	Actual Power
4	10	0,85	0,879312

The sample size is for each group.

√ Tamanho amostras: $n = 10$.

- Os resultados concordam razoavelmente com aqueles obtidos por meio da curva CO.

Intervalo de Confiança para Diferença de Médias – Variâncias Desconhecidas

- Caso 1: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

√ Distribuição da estatística de teste:

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

√ então:

$$P\{-t_{\alpha/2; n_1+n_2-2} \leq T \leq t_{\alpha/2; n_1+n_2-2}\} = 1 - \alpha$$

- √ Manipulando essas grandezas obtemos o intervalo de $100(1 - \alpha)\%$ de confiança para μ_1 e μ_2 .

- Seja $x_1 - x_2$ a diferença das médias de duas amostras aleatórias, de tamanhos n_1 e n_2 , oriundas de populações normais com variâncias σ_1^2 e σ_2^2 desconhecidas, porém iguais

√ Intervalo com $100(1-\alpha)\%$ de confiança para $\mu_1 - \mu_2$:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2; n_1+n_2-2} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$\leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\alpha/2; n_1+n_2-2} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Sendo:

- $t_{\alpha/2; n_1+n_2-2}$: percentil superior com $\alpha/2(100)\%$ da distribuição t com $n_1 + n_2 - 2$ graus de liberdade
- S_p : estimativa combinada de σ , desvio-padrão comum

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Exemplo 10-8

- Hidratação de cimento:

√ Análise do peso de cálcio em cimento-padrão e em cimento contendo chumbo

- Níveis reduzidos de cálcio indicam bloqueio no mecanismo de hidratação no cimento

√ Grupos

- 1: cimento-padrão ($n_1 = 10$)
- 2: cimento com chumbo ($n_2 = 15$)

√ Parâmetros de interesse:

- Teor médio percentual em peso de cálcio

- Dados amostrais:

√ Teor percentual em peso de cálcio

Cimento-padrão			Cimento c/ chumbo		
n_1	$\bar{x}_1$	s_1	n_2	$\bar{x}_2$	s_2
10	90,0	5,0	15	87,0	4,0

√ Suposições:

- Teor percentual em peso é normalmente distribuído
- Ambas as populações têm a mesma variância

√ Estimativa combinado do desvio-padrão

$$\begin{aligned} s_p &= \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \\ &= \sqrt{\frac{(9)(5,0)^2 + (14)(4,0)^2}{10 + 15 - 2}} \\ &= 4,42 \end{aligned}$$

- Intervalo de 95% de confiança para $\mu_1 - \mu_2$:

$$\sqrt{t_{0,025;23} = 2,069}$$

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{0,025;23} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{0,025;23} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} =$$

$$90,0 - 87,0 - 2,069(4,42) \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{15}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$

$$90,0 - 87,0 + 2,069(4,42) \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{15}} = -0,72 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 6,72$$

- √ Não podemos afirmar, com um nível de confiança de 95%, que a presença de chumbo afete esse mecanismo de hidratação

– Nesse nível de confiança não podemos concluir que haja diferença entre as médias
(intervalo inclui o zero)

- Seja $x_1 - x_2$ a diferença das médias de duas amostras aleatórias, de tamanhos n_1 e n_2 , oriundas de populações normais com variâncias σ_1^2 e σ_2^2 desconhecidas e desiguais.

√ Intervalo com $100(1-\alpha)\%$ de confiança para $\mu_1 - \mu_2$:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2;\nu} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\alpha/2;\nu} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

Sendo:

- $t_{\alpha/2;\nu}$: percentil superior com $\alpha/2(100)\%$ da distribuição t com ν graus de liberdade (correção)

Intervalo de Confiança para Diferença de Médias – Variâncias Desconhecidas

- Caso 2: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

√ Distribuição da estatística de teste:

$$T^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \stackrel{H_0}{\sim} t_\nu$$

- ν : graus de liberdade da distribuição t

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}}$$

√ Então:

$$P\{-t_{\alpha/2,\nu} \leq T^* \leq t_{\alpha/2,\nu}\} = 1 - \alpha$$

Teste t para Amostras Pareadas

Teste t Pareado

- As observações nas duas populações de interesse são coletadas em pares
 - √ Toma-se cada par (X_{1j}, X_{2j}) em condições homogêneas, mas elas podem mudar de um par para outro
- Exemplo:
 - √ Dois tipos de ponteiros para teste de dureza
 - Máquina pressiona ponteira em corpo-de-prova metálico
 - Dureza está relacionada com profundidade de depressão
 - Teste t pareado:
 - mede-se dureza das duas ponteiros em mesmo corpo-de-prova
 - Qual a vantagem do procedimento em relação à comparação com amostras independentes?

- Importante:
 - √ Os espécimes metálicos muito provavelmente não serão homogêneos!
- Teste t combinado:
 - √ Diferença observada entre as leituras de dureza média para os dois tipos de ponteiros também inclui as diferenças de dureza entre os espécimes
- Teste t pareado:
 - √ Analisa diferença entre as leituras de dureza em cada espécime
 - √ Se não houver diferença entre as ponteiros, a média da diferença deveria ser zero

Estimação de $\mu_1 - \mu_2$

- Sejam $(X_{11}, X_{21}), (X_{12}, X_{22}), \dots, (X_{1n}, X_{2n})$ observações pareadas.
 - √ X_1 : população normal com média μ_1 e variância σ_1^2 .
 - √ X_2 : população normal com média μ_2 e variância σ_2^2 .
 - √ Diferença entre cada par de observações:
 - $D_j = X_{1j} - X_{2j}, j = 1, 2, \dots, n.$
 - São normalmente distribuídas
 - Esperança de D_j : $\mu_D = E[X_1 - X_2] = \mu_1 - \mu_2$
 - Variância de D_j : σ_D^2 .

Teste t Pareado para $\mu_1 - \mu_2$

- Hipótese nula:
 - √ $H_0: \mu_D = \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0.$
 - Δ_0 : valor pré-especificado
- Estatística de teste: $T_0 = \frac{\bar{D} - \Delta_0}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}}$
 - √ $\bar{D}$, S_D e n , são, respectivamente, média amostral e desvio-padrão amostral das n diferenças
- Hipóteses alternativas:

Hipótese alternativa	Critério de rejeição
$H_1: \mu_D \neq \Delta_0$	$ t_0 > t_{\alpha/2, n-1}$
$H_1: \mu_D > \Delta_0$	$t_0 > t_{\alpha, n-1}$
$H_1: \mu_D < \Delta_0$	$t_0 < -t_{\alpha, n-1}$

Exemplo 10-9

- Resistência para vigas de aço
 - ✓ Comparação de métodos de previsão de resistência ao cisalhamento em travessias planas metálicas
 - ✓ Métodos: Karlsruhe e Lehigh
 - ✓ Há diferença (na média) entre os dois métodos?

Dados amostrais

- ✓ Previsões de resistência para nove travessias planas de aço
- ✓ (carga prevista/carga observada)
- Dados: *BD_producao.xlsx/ guia: cisalhamento*

Trave	Método		Diferença	Estatísticas amostrais
	Karlsruhe	Lehigh		
S1/1	1,186	1,061	0,125	$\bar{d} = 0,2739$ $s_D = 0,1351$
S2/1	1,151	0,992	0,159	
S3/1	1,322	1,063	0,259	
S4/1	1,339	1,062	0,277	
S5/1	1,200	1,065	0,135	
S2/1	1,402	1,178	0,224	Correlations: Karlsruhe; Lehigh Pearson correlation = 0,382 P-Value = 0,310
S2/2	1,365	1,037	0,328	
S2/3	1,537	1,086	0,451	
S2/4	1,559	1,052	0,507	

Procedimento de teste:

- Parâmetro de interesse: diferença na resistência média a cisalhamento entre métodos: $\mu_D = \mu_1 - \mu_2 = 0$.
- $H_0: \mu_D = 0$.
- $H_1: \mu_D \neq 0$.
- $\alpha = 0,05$ (digamos) $T_0 = \frac{\bar{D}}{\frac{s_D}{\sqrt{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{n-1}$
- Estatística de teste:
- Rejeite H_0 se $|t_0| > t_{0,025; 8} = 2,306$
- Estatística de teste observada: $t_0 = \frac{0,2739}{\frac{0,1351}{\sqrt{9}}} = 6,08$
- Conclusão:
 - $|t_0| = 6,08 > 2,306 \rightarrow$ Rejeitamos H_0
 - Há evidência para concluir, com $\alpha = 5\%$, que os métodos de previsão da resistência fornecem resultados diferentes.

Cálculo do p-valor – Minitab:

- ✓ No exemplo: $H_1: \mu_D \neq 0$.
- ✓ Estatística de teste observada:
 - $|t_0| = 6,08$

```

MTB > CDF 6,08;
SUBC> t 8.

Cumulative Distribution Function

Student's t distribution with 8 DF

  x   P( X <= x )
6,08 0,999852
    
```

- ✓ $p = 2 P\{t_8 > 6,08\} = 2(1 - 0,99985) = 0,0003$
- Rejeita-se $H_0: \mu_D = 0$ em favor de $H_1: \mu_D \neq 0$, a um nível $\alpha = 5\%$

- Minitab:
 - √ Banco de dados: *BD_producao.xlsx/catalisadores*

Stat > Basic Statistics > Paired t

- Análise gráfica:
 - √ Gráfico de valores individuais indica existir diferença entre métodos.
 - Método 1 produz previsões maiores para a resistência
 - √ Não há evidência amostral para rejeitar a hipótese de normalidade das diferenças

- Saída:
 - Estadísticas descritivas

Paired T-Test and CI: Karlsruhe; Lehigh

Paired T for Karlsruhe - Lehigh

	N	Mean	StDev	SE Mean
Karlsruhe	9	1,3401	0,1460	0,0487
Lehigh	9	1,0662	0,0494	0,0165
Difference	9	0,2739	0,1351	0,0450

95% CI for mean difference: (0,1700; 0,3777)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 6,08 P-Value = 0,000

IC 95%

- √ Valor-p confirma conclusão de rejeitar H_0 .
- √ Zero não pertence ao intervalo de confiança.
 - Há evidência amostral para rejeitar H_0 : $\mu_1 - \mu_2 = 0$.
- √ Estimacão intervalar da diferença:
 - Método de Karlsruhe produz, em média, previsões maiores para a resistência que o método de Lehigh

Comparações Pareadas vs Independentes

- Comparações de duas médias populacionais:

	Independentes	Pareadas
Estatística de teste	$T_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \Delta_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n}}}$	$T_0 = \frac{\bar{D} - \Delta_0}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}}$
Distribuição amostral	t_{2n-2}	t_{n-1}

- √ Numeradores são idênticos
- √ Denominadores:
 - Estatística combinada: supõe amostras independentes
 - Estatística pareada: há correlação (ρ) entre X_1 e X_2 .
- √ Teste t pareado perde $(n - 1)$ graus de liberdade em relação ao teste t independente

- Variância de $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ (mesmo tamanho amostral)

- √ Amostras independentes:

$$\begin{aligned}\text{Var}[\bar{X}_1 - \bar{X}_2] &= \text{Var}[\bar{X}_1] + \text{Var}[\bar{X}_2] \\ &= \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = \frac{2\sigma^2}{n}\end{aligned}$$

- √ Amostras pareadas:

- Em geral, $\rho > 0$.

$$\begin{aligned}\text{Var}[\bar{X}_1 - \bar{X}_2] &= \text{Var}[\bar{X}_1] + \text{Var}[\bar{X}_2] - 2\text{Cov}[\bar{X}_1, \bar{X}_2] \\ &= \sigma^2 + \sigma^2 - 2\rho\sigma^2 = \frac{2\sigma^2}{n}(1 - \rho)\end{aligned}$$

- √ Denominador estatística teste t pareado é menor que a do teste t independente

- Se houver correlação positiva entre pares e mesma variância em ambas populações

- Consequências:

- √ Teste t independente pode subestimar significância dos dados se for aplicado com amostras pareadas

- Valor da estatística do teste t independente menor que a do teste t pareado.

- √ Teste t independente tem mais poder contra quaisquer valores alternativos fixados do parâmetro

- Teste t pareado conduz a uma perda de $n - 1$ graus de liberdade em comparação ao teste t independente.

- √ Devemos ou não emparelhar as observações?

- Considerações para escolha entre amostras independentes e pareadas:

- √ Unidades experimentais relativamente homogêneas (σ pequeno) e correlação intrapares pequena:

- Ganho na precisão atribuído ao emparelhamento será compensado pela perda de graus de liberdade

- Deve ser usado experimento com amostras independentes

- √ Unidades experimentais relativamente heterogêneas (σ grande) e correlação intrapares grande:

- Deve ser usado experimento emparelhado

- Este caso ocorre tipicamente quando as unidades experimentais forem as mesmas para ambos os casos

- Considerar também:

- √ σ e ρ nunca são previamente conhecidos;

- √ Quantidade grande de graus de liberdade (40 ou 50):

- Perda de $n - 1$ graus de liberdade com emparelhamento pode não ser séria

- √ Quantidade pequena de graus de liberdade (10 ou 20)

- Perda de metade dos graus de liberdade será potencialmente séria se não for compensada por um aumento na precisão devido ao emparelhamento.

Intervalo de Confiança para μ_D

√ $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$, média de diferenças normalmente distribuídas:

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Então $P\{-t_{\alpha/2, n-1} \leq T \leq t_{\alpha/2, n-1}\} = 1 - \alpha$

sendo $t_{\alpha/2, (n-1)}$ o percentil superior com $\alpha/2(100)\%$ da t com $n-1$ graus de liberdade

√ Intervalo para $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$ com $100(1 - \alpha)\%$ de confiança

$$\bar{d} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_D}{\sqrt{n}} \leq \mu_D \leq \bar{d} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_D}{\sqrt{n}}$$

√ $\bar{d}$ e s_D são, respectivamente, a média e o desvio-padrão da diferença de n pares aleatórios de medidas

• Comentários:

√ Esse intervalo de confiança é válido para o caso em que $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

- S_D^2 estima $\sigma_D^2 = \text{Var}(\bar{D})$

√ Suposição de normalidade é desnecessária para amostras grandes ($n \geq 30$ pares)

- Aplica-se o Teorema Central do Limite

Exemplo 10-10

• Carros estacionados paralelamente

√ Estacionamento de dois carros de forma paralela, com barras de direção e raios de giro diferentes

√ Resposta:

- Tempo em segundos para cada pessoa

√ Amostragem:

- 14 pessoas estacionando dos dois carros

• Dados amostrais

√ Tempo para estacionamento de 2 carros em paralelo (s)

- Dados: *BD_producao.xlsx/guia: estacionamento*

Pessoa	Automóvel		Diferença	Pessoa	Automóvel		Diferença
	1	2			1	2	
1	37,0	17,8	19,2	8	58,2	32,2	26,0
2	25,8	20,2	5,6	9	33,6	27,8	5,8
3	16,2	16,8	-0,6	10	24,4	23,2	1,2
4	24,2	41,4	-17,2	11	23,4	29,6	-6,2
5	22,0	21,4	0,6	12	21,2	20,6	0,6
6	33,4	38,4	-5,0	13	36,2	32,2	4,0
7	23,8	16,8	7,0	14	29,8	53,8	-24,0

Estatísticas amostrais: $\bar{d} = 1,21$
 $s_D = 12,68$

- Intervalo de 90% de confiança para $\mu_1 - \mu_2$:

$$\sqrt{t_{0,05;13}} = 1,771$$

$$\begin{aligned} \bar{d} - t_{0,05;13} \frac{s_D}{\sqrt{n}} &\leq \mu_D \leq \bar{d} + t_{0,05;13} \frac{s_D}{\sqrt{n}} = \\ 1,21 - 1,771 \frac{12,68}{\sqrt{14}} &\leq \mu_D \leq 1,21 + 1,771 \frac{12,68}{\sqrt{14}} = \\ -4,79 &\leq \mu_D \leq 7,21 \end{aligned}$$

√ Com um nível de confiança de 90%, não podemos afirmar de que os dois carros têm diferentes tempos médios para estacionar

(intervalo não inclui o zero)

- Valor $\mu_D = \mu_1 - \mu_2 = 0$ é consistente com os dados observados

Inferência para as Variâncias de Duas Distribuições Normais

Distribuição F

- A variável aleatória F é definida como:

$$F = \frac{W}{\frac{Y}{v}}$$

√ W e Y são variáveis aleatórias qui-quadrado **independentes** com, respectivamente, u e v graus de liberdade

√ Essa variável aleatória segue a distribuição F com u graus de liberdade no denominador e v graus de liberdade.

√ Notação: $F \sim F_{u, v}$.

Distribuição Ft – Função de Densidade

- Seja X uma variável aleatória com distribuição F com u graus de liberdade no numerado e v, no denominador:

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{u+v}{2}\right) \left(\frac{u}{v}\right)^{u/2} x^{(u/2)-1}}{\Gamma\left(\frac{u}{2}\right) \Gamma\left(\frac{v}{2}\right) \left[\left(\frac{u}{v}\right)x + 1\right]^{(u+v)/2}}, 0 < x < \infty; u, v \in \mathbb{N}$$

√ Média da distribuição F: $E[X] = \frac{v}{v-2}, v > 2$

√ Variância da distribuição F:

$$\text{Var}[X] = \frac{2v^2(u+v-2)}{u(v-2)^2(v-4)}, v > 4$$

- $f_{\alpha, u, v}$: Percentis da F com u e v graus de liberdade
 $\sqrt{\text{Seja a variável aleatória } F \sim F_{u, v} \text{ então } P\{F > f_{\alpha, u, v}\} = \alpha}$
- Exemplo – Unilateral Superior
 $\sqrt{\alpha = 0,05; u = 5 \text{ e } v = 10}$

v_2	Degrees of freedom for the numerator							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95
17	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85

$P\{F_{5, 10} > 3,33\} = 0,05$

- Exemplo – Unilateral:
 $\sqrt{\alpha = 0,05, u = 5 \text{ e } v = 10}$
 $\sqrt{\text{Tabela contém somente percentis superiores}}$
 $\sqrt{\text{Pontos percentuais inferiores: } f_{1-\alpha, u, v} = \frac{1}{f_{\alpha, v, u}}}$

v_2	Degrees of freedom for the numerator									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.86
17	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.76

$f_{0,95;5,10} = \frac{1}{f_{0,05;10,5}} = \frac{1}{4,74} = 0,211$
 $P\{F_{5,10} \leq 0,211\} = 0,05$

- Exemplo – Bilateral:
 $\sqrt{\alpha = 0,05, u = 5 \text{ e } v = 10}$

$f_{0,025;5,10} = 4,24$
 $f_{0,975;5,10} = \frac{1}{f_{0,025;10,5}} = \frac{1}{6,62} = 0,151$

v_2	Degrees of freedom for the numerator											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	976.7	981.8
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.42
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.30
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.70
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.47
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.32
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.62
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.15
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.82
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.57

$P\{F_{5,10} > 4,24\} = 0,025$
 $P\{F_{5,10} < 0,151\} = 0,025$
 $P\{0,151 \leq F_{5,10} \leq 4,24\} = 0,95$

Teste de Hipóteses para a Razão de Variâncias

- Suponha:
 - √ Duas populações normais independentes
 - √ μ_1 e μ_2 : médias desconhecidas das populações
 - √ σ_1^2 e σ_2^2 : variâncias desconhecidas das populações
- Interesse:
 - √ Testar hipóteses relativas à igualdade das variâncias
- Hipóteses:
 - √ $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
 - √ $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Variâncias Amostrais

- Amostra de tamanho n_1 de população normal com média μ_1 e variância σ_1^2 desconhecidas
 - √ S_1^2 : variância da amostra 1
- Amostra de tamanho n_2 de população normal com média μ_2 e variância σ_2^2 desconhecidas
 - √ S_2^2 : variância da amostra 2
- Populações independentes

Razão das Variâncias Amostrais

- Razão das variâncias amostrais:

$$F = \frac{\frac{S_1^2}{n_1}}{\frac{S_2^2}{n_2}} \sim F_{(n_1-1), (n_2-1)}$$

√ Quociente de variáveis aleatórias independentes

√ Numerador: $\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{n_1-1}^2$

√ Denominador: $\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{n_2-1}^2$

Teste para a Razão de Variâncias de Duas Populações Normais

- Hipótese nula:
 - √ $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$.
- Estatística de teste: $F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2}$
- Hipóteses alternativas:

Hipótese alternativa	Critério de rejeição
$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$f_0 > f_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$ ou $f_0 < f_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$
$H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$	$f_0 > f_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$
$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$f_0 < f_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$

Exemplo 10-11

- Variabilidade em pastilhas de semicondutores
 - √ Espessura obtida por meio de mistura de gases
 - √ Variabilidade da espessura é característica crítica
 - Deseja-se baixa variabilidade
 - √ Estudadas duas misturas diferentes de gases
 - Interesse em determinar se uma delas é superior na redução da variabilidade de espessura
 - √ Há qualquer evidência que indique ser um gás preferível em relação ao outro?
 - Use $\alpha = 5\%$.

- Dados Amostrais:

√ Espessura da camada de óxido (ângstrom)

Mistura 1		Mistura 2	
n_1	s_1	n_2	s_2
20	1,96	20	2,13

- √ Consideraremos que a espessura de óxido seja uma variável aleatória normal para ambas as misturas de gases
 - Os valores amostrais não estão disponíveis para se conduzir testes de normalidades para verificar esta suposição

- Procedimento de teste:

1. Parâmetros de interesse: variâncias σ_1^2 e σ_2^2 , da espessura das camadas de óxido.
2. $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$.
3. $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.
4. $\alpha = 0,05$
5. Estatística de teste: $f_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2} \underset{H_0}{\sim} F_{n_1-1, n_2-1}$
6. Rejeite H_0 se:
 - $f_0 > f_{0,025; 19; 19} = 2,53$ ou $f_0 < f_{0,975; 19; 19} = 1/2,53 = 0,40$
7. Estatística de teste observada: $f_0 = \frac{(1,96)^2}{(2,13)^2} = \frac{3,84}{4,54} = 0,85$
8. Conclusão:
 - $0,40 < f_0 = 0,85 < 2,53 \rightarrow$ Falhamos em rejeitar H_0
 - Não há evidência forte para indicar um gás que resulte em variância menor na espessura de óxido, com $\alpha = 5\%$.

- Cálculo do p-valor – Minitab:

√ No exemplo: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

√ Estatística de teste observada:

- $f_0 = 0,85$
- $1/f_0 = 1,18$

```

MTB > CDF C1;
SUBC> F 19 19.

Cumulative Distribution Function

F distribution with 19 DF in numerator and 19 DF in denominator

  x      P( X <= x )
  ---
0,85    0,363400
1,18    0,639011
    
```

√ Cálculo de p:

- $P\{F_{19, 19} < 0,85\} = 0,3640$ (f_0 está mais à esquerda!)
- $P\{F_{19, 19} > 1,18\} = 1 - 0,6390 = 0,3610$
- $P = 0,3640 + 0,3610 = 0,7244$
- $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ não pode ser rejeitada em favor de $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, a um nível $\alpha = 5\%$

- Minitab:
 ✓ Base de dados não está disponível

Stat > Basic Statistics > 2 Variances

- Saída:

Test and CI for Two Variances

Method
 Null hypothesis $\sigma(1) / \sigma(2) = 1$
 Alternative hypothesis $\sigma(1) / \sigma(2) \text{ not} = 1$
 Significance level $\alpha = 0,05$

Estadísticas descritivas

Sample	N	StDev	Variance
1	20	1,960	3,842
2	20	2,130	4,537

Ratio of standard deviations = 0,920
 Ratio of variances = 0,847

Estadística de teste

95% Confidence Intervals

Distribution	CI for StDev of Data	CI for Variance of Data
Normal	(0,579; 1,463)	(0,335; 2,139)

IC 95%

1 não pertence ao IC

Teste F

Method	DF1	DF2	Statistic	P-Value
F Test (normal)	19	19	0,85	0,721

- Conclusões:
 ✓ Valor-p confirma conclusão de não rejeitar H_0 .
 ✓ Um não pertence ao intervalo de confiança.
 • Há evidência amostral para não rejeitar H_0 : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

Erro Tipo II e Tamanho da Amostra

- Curvas Características de Operação:
 ✓ Gráficos – Apêndice:
 - VIIo, VIIp: hipóteses alternativas bilaterais
 - VIIq e VIIr: hipóteses alternativas unilaterais
 ✓ Curvas para $\alpha = 0,05$ e $\alpha = 0,01$
 ✓ Considerando $n_1 = n_2 = n$
 ✓ Parâmetro λ : $\lambda = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$

- Teste bilateral e nível de significância $\alpha = 0,05$

(o) O.C. curves for different values of n for the two-sided F -test for a level of significance $\alpha = 0.05$.

- Teste bilateral e nível de significância $\alpha = 0,01$

(p) O.C. curves for different values of n for the two-sided F -test for a level of significance $\alpha = 0.01$.

- Teste unilateral e nível de significância $\alpha = 0,05$

(q) O.C. curves for different values of n for the one-sided F -test for a level of significance $\alpha = 0.05$.

- Teste unilateral e nível de significância $\alpha = 0,01$

(r) O.C. curves for different values of n for the one-sided F -test for a level of significance $\alpha = 0.01$.

Exemplo 10-12

- Variabilidade em pastilhas de semicondutores
 - √ Espessura obtida por meio de mistura de gases
 - √ Variabilidade da espessura é característica crítica
 - Deseja-se baixa variabilidade
 - √ Estudadas duas misturas diferentes de gases
 - Interesse em determinar se uma delas é superior na redução da variabilidade de espessura
 - √ Desejamos detectar metade do desvio-padrão da espessura entre os gases, com no mínimo 0,80
 - Você acha adequado o tamanho de amostra de $n_1=n_2=n=20$?
 - Use $\alpha = 5\%$.

(o) O.C. curves for different values of n for the two-sided F -test for a level of significance $\alpha = 0.05$.

- √ Determinação do erro tipo II:
 - $b \approx 0,20 \rightarrow$ Poder = 0,80
 - Os tamanhos das amostras: $n_1 = n_2 = 20$ são adequados

1. $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs. $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

- Razão que se deseja dectar:

$$\lambda = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = 2$$

- Tamanhos das amostras:

$$\sqrt{n_1 = n_2 = 20}$$

Intervalo de Confiança para para a Razão de Duas Variâncias

- Distribuição da estatística F :

$$F = \frac{S_2^2/n_2}{S_1^2/n_1} \sim F_{n_2-1, n_1-1}$$

√ então:

$$P \{ f_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1} \leq F \leq f_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1} \} = 1 - \alpha$$

- √ Manipulando essas grandezas obtemos o intervalo de $100(1 - \alpha)\%$ de confiança para σ_1^2 e σ_2^2 .

- Sejam s_1^2 e s_2^2 as variâncias de amostras aleatórias de tamanhos n_1 e n_2 , provenientes de populações normais com variâncias desconhecidas σ_1^2 e σ_2^2

√ Intervalo com 100(1- α)% de confiança para σ_1^2/σ_2^2 :

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} f_{1-\alpha/2, n_2-1, n_1-1} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2} f_{\alpha/2, n_2-1, n_1-1}$$

Sendo:

- $f_{\alpha/2; n_1-1; n_2-1}$: percentil superior com $\alpha/2(100)$ % da distribuição F com $n_2 - 1$ graus de liberdade no numerador e $n_1 - 1$ graus de liberdade no denominador

- Comentário:

√ Intervalo de confiança para a razão entre dois desvios-padrão pode ser obtida extraindo a raiz quadrada do intervalo de confiança para a razão de variâncias

Exemplo 10-13

- Acabamento de superfície de liga de titânio
 - √ Fabricação de propulsores para uso em turbinas
 - √ Podem ser usados dois processos para esmerilhar determinada superfície
 - Podem produzir peças com iguais rugosidades médias nas superfícies
 - √ Construir um intervalo de 90% de confiança para a razão dos desvios-padrão dos dois processos (σ_1/σ_2)
 - Considerar os dois processo independentes e que a rugosidade na superfície seja normalmente distribuída

- Dados Amostrais:

√ Rugosidade em superfície (micropolegada)

Processo 1		Processo 2	
n_1	s_1	n_2	s_2
11	5,1	16	4,7

- √ Consideraremos que os dois processo são independentes e que a rugosidade na superfície seja normalmente distribuída
 - Os valores amostrais não estão disponíveis para se conduzir testes de normalidades para verificar esta suposição

- Intervalo de 90% de confiança para σ_1/σ_2 :

$$\sqrt{f_{0,05;15,10}} = 2,85$$

$$\sqrt{f_{0,95;15,10}} = 0,39 \quad f_{0,95;15,10} = \frac{1}{f_{0,05,10,15}} = \frac{1}{2,54} = 0,39$$

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} f_{0,95;15;10} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2} f_{0,05;15;10}$$

$$\frac{(5,1)^2}{(4,7)^2} 0,39 \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{(5,1)^2}{(4,7)^2} 2,85 \quad \sqrt{0,459} \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \leq \sqrt{3,356}$$

$$0,459 \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \leq 3,356 \quad 0,678 \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \leq 1,832$$

√ Com um nível de confiança de 90%, não podemos afirmar que os desvios-padrão da rugosidade da superfície para os dois processos sejam diferentes (intervalo não inclui o um)

- Comentário:

√ A um nível de confiança de 90%, não se rejeita a hipótese de igualdade das variâncias em favor de H_1 : $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

• Saída: Test and CI for Two Variances

```

Method
Null hypothesis      Sigma(1) / Sigma(2) = 1
Alternative hypothesis Sigma(1) / Sigma(2) not = 1
Significance level   Alpha = 0,1
    
```

Estadísticas descritivas

Sample	N	StDev	Variance
1	11	5,100	26,010
2	16	4,700	22,090

Ratio of standard deviations = 1,085
Ratio of variances = 1,177

Estadística de teste

90% Confidence Intervals

Distribution of Data	CI for StDev Ratio	CI for Variance Ratio
Normal	(0,680; 1,830)	(0,463; 3,350)

IC 95%

1 não pertence ao IC

Teste F

Method	DF1	DF2	Test Statistic	F-Value
F Test (normal)	10	15	1,18	0,751

Inferência para as Proporções de Duas Populações

Inferência para Proporções de Duas Populações

- Parâmetros de interesse:
 - √ Proporções binomiais p_1 e p_2 .
- Inferência para amostras grandes:
 - √ Teste de hipóteses e intervalos de confiança baseados na aproximação binomial pela normal.

Testes para Diferenças na Proporções de uma População

- Suponha duas amostras aleatórias independentes, retiradas de duas populações:
 - √ Tamanhos amostrais: n_1 e n_2 .
 - √ Número de observações que pertencem à categoria de interesse: X_1 e X_2 .
- Estimadores das proporções populacionais:

$$\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1}$$

$$\hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2}$$
- Hipóteses de interesse:
 - $H_0: p_1 = p_2$
 - $H_1: p_1 \neq p_2$

Estatística de Teste para $p_1 - p_2$

$$Z = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

para n_1 e n_2 grandes

- Se $p_1 = p_2$ (H_0 verdadeira)
 - √ p é desconhecido!
- Estimador do parâmetro p (comum): $\hat{P} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$
- Estatística de teste para $H_0: p_1 = p_2$:

$$Z_0 = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2}{\sqrt{\hat{P}(1 - \hat{P}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1)$$

Testes Aproximados para $p_1 - p_2$

- Hipótese nula:
 - √ $H_0: p_1 = p_2$.
- Estatística de teste: $Z_0 = \frac{\bar{P}_1 - \bar{P}_2}{\sqrt{\hat{P}(1 - \hat{P}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$
- Hipóteses alternativas:

Hipótese alternativa	Critério de rejeição
$H_1: p_1 \neq p_2$	$ z_0 > z_{\alpha/2}$
$H_1: p_1 > p_2$	$z_0 > z_{\alpha}$
$H_1: p_1 < p_2$	$z_0 < -z_{\alpha}$

Exemplo 10-14

- Erva-de-são-joão
 - √ Extratos utilizados para tratar depressão
 - √ Teste para comparar eficácia de extrato-padrão de erva-de-são-joão com placebo
 - √ Amostra: 200 pacientes com depressão unipolar
 - Alocação aleatória em dois grupos (extrato-1 e placebo-2)
 - Após oito semanas, melhoraram: 27 (X_1) pacientes tratados com a erva-de-são-joão e 19 (X_2), tratados com placebo.
 - √ Há alguma razão para acreditar que a erva-de-são-joão seja efetiva no tratamento de depressão?
 - Use $\alpha = 5\%$

- Dados Amostrais:
 - √ Pacientes com melhora no quadro de depressão unipolar (após 8 semanas)

Erva-de-são-joão		Placebo	
n_1	x_1	n_2	x_2
100	27	100	19

- Proporções amostrais: $\hat{p}_1 = \frac{27}{100} = 0,27$
 $\hat{p}_2 = \frac{19}{100} = 0,19$
- Estimador do parâmetro comum p (sob H_0)

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{19 + 27}{100 + 100} = 0,23$$

- Procedimento de teste:
 1. Parâmetros de interesse: p_1 e p_2 , proporções de pacientes que melhoraram após 8 semanas.
 2. $H_0: p_1 = p_2$.
 3. $H_1: p_1 \neq p_2$.
 4. $\alpha = 0,05$
 5. Estatística de teste: $Z_0 = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - 0}{\sqrt{(\hat{P}(1 - \hat{P}))\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$
 6. Rejeite H_0 se $|z_0| > z_{0,05} = 1,96$
 7. Estatística de teste observada:
 8. Conclusão: $z_0 = \frac{0,27 - 0,19}{\sqrt{0,23(1 - 0,23)\left(\frac{(8)^2}{10} + \frac{(8)^2}{10}\right)}} = 1,34$
 - $|z_0| = 1,34 < 1,96 \rightarrow$ Falhamos em rejeitar H_0

- Conclusão:
 - √ Não há evidência suficiente para confirmar que a erva-de-são-joão seja efetiva no tratamento de depressão unipolar.

• Cálculo do p-valor – Minitab:

√ No exemplo: $H_1: p_1 \neq p_2$.

√ Estatística de teste observada:

- $z_0 = 1,34$

Cumulative Distribution Function	
Normal with mean = 0 and standard deviation = 1	
x	P(X ≤ x)
1,34	0,909877

√ $p = P\{Z > 1,34\} = 1 - \Phi(1,34) = 1 - 0,9099 = 0,180$

• $H_0: p_1 = p_2$ seria rejeitada com qualquer nível de significância $\alpha \geq 0,180$

• Minitab:

Stat > Basic Statistics > 2 Proportions

• Saída:

Estadísticas descritivas		Test and CI for Two Proportions	
Sample	X	N	Sample p
1	27	100	0,270000
2	19	100	0,190000
Teste Z			
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: 0,08			
95% CI for difference: (-0,0361186; 0,196119)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = 1,34 P-Value = 0,179			
IC 95% Fisher's exact test: P-Value = 0,239			

√ Valor-p confirma conclusão de não rejeitar H_0 .

√ Zero pertence ao intervalo de confiança.

- Não há evidência amostral para rejeitar $H_0: p_1 = p_2$.

√ Teste exato de Fisher:

- Usado com qualquer tamanho amostral
- Não usa aproximação pela normal (p-valor maior!)

Erro Tipo II e Tamanho da Amostra

• Cálculo de β é complicado no caso de 2 amostras

√ Denominador de Z_0 usa estimador combinado de p (sob $H_0: p_1 = p_2$)

√ Quando H_0 for falsa ($p_1 \neq p_2$)

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

- Erro tipo II aproximado de teste **bilateral** para a diferença de proporções de 2 populações:

$$\beta = \Phi \left[\frac{z_{\alpha/2} \sqrt{\bar{p}\bar{q} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} - (p_1 - p_2)}{\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}} \right] - \Phi \left[\frac{-z_{\alpha/2} \sqrt{\bar{p}\bar{q} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} - (p_1 - p_2)}{\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}} \right]$$

√ em que:

$$\bar{p} = \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2}$$

$$\bar{q} = \frac{n_1(1 - p_1) + n_2(1 - p_2)}{n_1 + n_2}$$

- Erro tipo II aproximado de teste **unilateral** para a diferença de proporções de 2 populações:

√ $H_1: p_1 > p_2$.

$$\beta = \Phi \left[\frac{z_{\alpha} \sqrt{\bar{p}\bar{q} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} - (p_1 - p_2)}{\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}} \right]$$

√ $H_1: p_1 < p_2$:

$$\beta = 1 - \Phi \left[\frac{-z_{\alpha} \sqrt{\bar{p}\bar{q} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} - (p_1 - p_2)}{\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}} \right]$$

Cálculo Tamanho Amostral

- Teste de hipóteses da diferença de proporções:

√ $H_1: p_1 = p_2$.

√ Valores especificados de p_1 e p_2 .

√ Mesmos tamanhos amostrais: $n = n_1 = n_2$.

√ Tamanho aproximado da amostra

$$n \approx \frac{\left[z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{(p_1 + p_2)(q_1 + q_2)}{2}} + z_{\beta} \sqrt{p_1 q_1 + p_2 q_2} \right]^2}{(p_1 - p_2)^2}$$

sendo: $q_1 = 1 - p_1$ e $q_2 = 1 - p_2$

√ Para alternativa unilateral troque $z_{\alpha/2}$ por z_{α} .

Intervalo de Confiança para a Diferença de Proporções de Populações

- Distribuição da estatística Z:

√ Para amostras grandes:

$$Z = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

√ então:

$$P \{ -z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2} \} = 1 - \alpha$$

√ Manipulando essas grandezas obtemos o intervalo de $100(1 - \alpha)\%$ de confiança para p_1 e p_2 .

Intervalo de Confiança para a Diferença de Médias, Variâncias Conhecidas

- Se $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ forem as proporções amostrais em duas amostras aleatórias e independentes, de tamanhos n_1 e n_2 , que pertençam a uma categoria de interesse.

√ Intervalo com $100(1-\alpha)\%$ de confiança para $p_1 - p_2$:

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \leq p_1 - p_2 \leq \hat{p}_1 - \hat{p}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

sendo $z_{\alpha/2}$ o percentil superior com $\alpha/2(100)\%$ da normal padrão

- Dados Amostrais:

√ Pacientes com melhora no quadro de depressão unipolar (após 8 semanas)

Processo em uso		Processo modificado	
n_1	x_1	n_2	x_2
85	10	85	8

- Proporções amostrais: $\hat{p}_1 = \frac{10}{85} = 0,12$
 $\hat{p}_2 = \frac{8}{85} = 0,09$

Exemplo 10-15

- Mancais de eixos de manivelas de motores

√ Característica de interesse:

- Não-conformidade de acabamento da superfície

√ Amostras:

- Grupo 1: Processo em uso

- $n_1 = 85$ mancais, dos quais 10 (X_1) são não-conformes

- Grupo 2: Processo modificado

- $n_2 = 85$ mancais, dos quais 8 (X_2) são não-conformes

√ Obter estimativa intervalar, com 95% de confiança, para a diferença de proporção de mancais defeituosos produzidos pelos dois processos

- Intervalo com 95% de confiança para $p_1 - p_2$:

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \leq p_1 - p_2 \leq$$

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

$$0,12 - 0,09 - 1,96 \sqrt{\frac{0,12(0,88)}{85} + \frac{0,09(0,91)}{85}} \leq p_1 - p_2 \leq$$

$$0,12 - 0,09 + 1,96 \sqrt{\frac{0,12(0,88)}{85} + \frac{0,09(0,91)}{85}}$$

$$-0,06 \leq p_1 - p_2 \leq 0,12$$

√ Baseado nos dados amostrais, parece improvável que modificação no processo de acabamento tenha reduzido a proporção de mancais defeituosos:

- Intervalo de confiança inclui o zero.

• Minitab:

Stat > Basic Statistics > 2 Proportions

• Saída:

Estadísticas descritivas

Sample	X	N	Sample p
1	10	85	0,117647
2	8	85	0,094118

Teste Z

Difference = p (1) - p (2)
 Estimate for difference: 0,0235294
 95% CI for difference: (-0,0689074; 0,115966)
 Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = 0,50 P-Value = 0,618

IC 95%
 Fisher's exact test: P-Value = 0,804

- ✓ Valor-p confirma conclusão de não rejeitar H_0 .
- ✓ Zero pertence ao intervalo de confiança.
 - Não há evidência amostral para rejeitar H_0 ; $p_1 = p_2$.
- ✓ Teste exato de Fisher:
 - p-valor maior! (não usa aproximação pela normal)

Resumo dos Procedimentos de Inferência para Duas Amostras

Referências

Bibliografia Recomendada

- Montgomery, D. C. (LTC)
Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros
- Pinheiro, J. I. D et al. (Campus)
Probabilidade e Estatística: Quantificando a Incerteza